



**Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.**

Leitlinien, Empfehlungen, Stellungnahmen  
Stand Oktober 2011

1. Allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie
  - 1.8. Stellungnahmen
  - 1.8.5. Empfehlung zum Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung/Genitalverstümmelung (Female Genital Cutting/Mutilation, FGC/FGM)
- 

*Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe*

**Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung/Genitalverstümmelung (Female Genital Cutting/Mutilation, FGC/FGM)<sup>1</sup>**

**Präambel**

Die DGGG verurteilt jeden medizinisch nicht indizierten Eingriff und jede Verletzung am äußeren Genitale von Mädchen und jungen Frauen, allgemein bezeichnet als Female Genital Mutilation – Weibliche Genitalverstümmelung oder Female Genital Cutting – Weibliche Genitalbeschneidung. Sie unterstützt alle nationalen und internationalen Maßnahmen und Aktivitäten, um diese Eingriffe und diese Tradition in Deutschland und weltweit zurückzudrängen und zu verhindern.

**1 Vorwort**

Der Begriff „Weibliche Genitalbeschneidung“ (Female Genital Cutting – FGC) bzw. „weibliche Genitalverstümmelung“ umfasst alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige Entfernung der weiblichen Genitalien oder deren Verletzung zum Ziel haben, sei es aus kulturellen oder anderen nichttherapeutischen Gründen (WHO 1998).

Die DGGG verzichtet in der hier vorgelegten ärztlichen Handlungsanweisung auf den Gebrauch der Begriffe "FGM = female genital mutilation" bzw. "genitale Verstümmelung". Dies dient der Vermeidung eines zum bestehenden anatomischen Problem zusätzlichen Labelling-Effekts, der nachweislich für die Kommunikation mit Betroffenen nachteilig ist. Gegenüber Betroffenen soll grundsätzlich von „weiblicher Beschneidung“ gesprochen werden. Der Ausdruck „Genitalverstümmelung“ (Female Genital Mutilation – FGM) wird von den betroffenen

---

<sup>1</sup> Auch wenn international durch die WHO und durch die Organisationen der Betroffenen der Begriff „Weibliche Genitalverstümmelung“ (Female genital Mutilation) verwendet wird, um die Grausamkeit dieser Handlung zum Ausdruck zu bringen, wird in dieser Leitlinie die Begrifflichkeit „Weibliche Genitalbeschneidung“ (female genital cutting) verwendet. Dieses geschieht, um die Frauenärztinnen und Frauenärzte von vorneherein darauf aufmerksam zu machen, dass den betroffenen Frauen gegenüber nur von „weiblicher Beschneidung“ und nicht von „weiblicher Genitalverstümmelung“ gesprochen werden sollte, um eine zusätzliche Traumatisierung durch die Begrifflichkeit zu vermeiden.

Frauen selbst als verletzend empfunden und stellt einen zusätzlichen Eingriff in ihre persönliche Integrität dar.

Die betroffenen Frauen können ihr Leben lang unter den körperlichen und psychischen Folgen des Eingriffs leiden. Nicht selten ist eine dauerhafte medizinische Behandlung erforderlich.

Laut WHO werden mindestens 2 Millionen Mädchen pro Jahr beschnitten (WHO 1995). Weltweit sind schätzungsweise 150 Millionen Frauen und Mädchen von FGC betroffen. Die meisten dieser Frauen leben in 28 afrikanischen Staaten (Toubia 1999), im Süden der Arabischen Halbinsel, in einigen Ländern Südostasiens und in Kurdistan.

Doch auch in Deutschland ist die weibliche Genitalbeschneidung ein Problem, das durch Migration immer häufiger wird. Zur Zeit leben in Deutschland schätzungsweise 20.000 Frauen, die von einer Beschneidung betroffen sind (Terre des Femmes, Mai 2008).

Female Genital Cutting ist fest in der Tradition und Kultur der jeweiligen Gesellschaftsordnung verwurzelt. Zahlreiche Argumente werden – je nach Region unterschiedlich – zur Rechtfertigung der Beschneidung aufgeführt. In vielen Regionen gilt FGM als Initiationsritus, durch den junge Frauen in die Gesellschaft aufgenommen werden. Versuche, dieses Ritual aus europäisch tradiertem Sichtweise in Frage zu stellen, werden oft als Einmischung in die Tradition und als Diktat westlicher Lebensweisen gesehen und abgelehnt.

Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte und der psychosozialen Beratungsstellen in Deutschland ist es, den betroffenen Frauen eine Betreuung zu ermöglichen, die den kulturellen Hintergrund respektiert und einfühlsam reagiert. Dabei sollten sie auf Basis einer differenzierten Kenntnis des komplexen Problems die Zusammenhänge sichtbar machen zwischen der Genital Cutting und den medizinischen (einschließlich psychologischen) Folgen. Für behandelnde Ärzte gilt es, gemeinsam mit den Betroffenen entsprechend ihrem Leidensdruck individuelle Lösungen zu erarbeiten bei Beschwerden, in der Schwangerschaft und bei der Geburt.

Dies betrifft vor allem den Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe. Zudem muss die Female Genital Cutting in Deutschland lebender Mädchen soweit möglich verhindert werden.

Für eine adäquate Behandlung von Patientinnen nach FGC bedarf es eines tiefen Wissens des medizinischen Personals über Ätiologie und Formen dieser Praktik und klarer Empfehlungen zum Umgang mit Frauen nach Genital Cutting. Hierbei sollen die Empfehlungen der DGGG eine Hilfe sein.

## **2 Hintergrund und Definition**

Die weibliche Genitalbeschneidung (Female Genital Cutting) ist vor allem in Teilen Ost-Afrikas sehr verbreitet. Sie wird meist bei Säuglingen, Kleinkindern oder jungen Mädchen durchgeführt und stellt einen Eingriff in die persönliche Integrität dar mit vielfältigen medizinischen, psychischen und sozialen Folgen (vgl. Schweizerische Empfehlungen für Ärztinnen, Ärzte, Hebammen und Pflegefachkräfte: „Patientinnen mit genitaler Beschneidung“, <http://www.sggg.ch>, sowie „Weibliche Genitalverstümmelung – Umgang mit Betroffenen und Prävention. Empfehlungen für Angehörige des Gesundheitswesens und weitere potentiell involvierte Berufsgruppen“ der AG FIGE. <http://www.ag-fide.de>).

Gemäß der Klassifikation der WHO (überarbeitete Fassung von 2008) werden vier Formen von Female Genital Cutting unterschieden:

- Typ I: Partielle oder vollständige Entfernung der Klitoris und/oder der Klitorisvorhaut (Klitoridektomie),
- Typ II: Partielle oder vollständige Entfernung der Klitoris und der kleinen Schamlippen, mit oder ohne Entfernung der großen Labien (Exzision),
- Typ III: "Infibulation" oder „Pharaonische Beschneidung“: Verengung der vaginalen Öffnung mit Herstellung eines bedeckenden, narbigen Hautverschlusses durch das Entfernen und Zusammenheften oder –nähen der kleinen und/oder großen Schamlippen, mit oder ohne Entfernung der Klitoris (ca. 15% der Fälle),
- Typ IV: Alle anderen schädigenden Eingriffe, die die weiblichen Genitalien verletzen und keinem medizinischen Zwecke dienen, zum Beispiel: Einstechen, Durchbohren, Einschneiden, Ausschaben, Ausbrennen, Verätzen, Dehnen.

Ärztinnen und Ärzte werden zumeist mit Problemen konfrontiert, die durch die Infibulation entstanden sind. Allerdings können auch die übrigen FGC-Typen erhebliche gesundheitliche Probleme nach sich ziehen.

### **3 Rechtliche und ethische Bewertungen**

Wenngleich die weibliche Genitalbeschneidung, die meist nicht von Ärzten durchgeführt wird, in den betreffenden Ländern sozial akzeptiert ist, müssen aus unserer Sicht dieser Eingriff und die ärztliche Beteiligung daran abgelehnt werden.

In Deutschland ist dieser Eingriff als Körperverletzung (§ 223 StGB), gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB), u. U. schwere Körperverletzung (§ 226 StGB) sowie Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) strafbewehrt. Dies gilt auch, wenn der Eingriff auf Verlangen der Patientin ausgeführt wird (vgl. BT-Drucksache 13/8281 vom 23. 7. 1997).

Die (Muster-)Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte hält in der Generalpflichtenklausel des § 2 Abs. 2 fest: "Ärztinnen und Ärzte haben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen bei ihrer Berufsausübung entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen." Außerdem bestimmt § 2 Abs. 1 der (Muster-)Berufsordnung: "Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind oder deren Befolgung sie nicht verantworten können."

Entsprechend hat der 99. Deutsche Ärztetag 1996 in Köln folgende EntschlieÙung zur rituellen Beschneidung weiblicher Genitalien verabschiedet:

*"Der 99. Deutsche Ärztetag verurteilt die Beteiligung von Ärzten an der Durchführung jeglicher Form von Beschneidung weiblicher Genitalien und weist darauf hin, dass entsprechend der Generalpflichtenklausel der Berufsordnung für die deutschen Ärzte derartige Praktiken berufsrechtlich zu ahnden sind. In anderen europäischen Staaten (z. B. Norwegen, Dänemark, Frankreich) ist die rituelle Verstümmelung weiblicher Genitalien bereits gesetzlich unter Strafe gestellt."*

Dies bekräftigte der 100. Deutsche Ärztetag 1997: "Gemäß der Generalpflichtenklausel der Berufsordnung für die deutschen Ärzte ist die Vornahme derartiger Praktiken berufsrechts-

widrig. Durch die genitalen Verstümmelungen werden Mädchen und Frauen fundamentale Menschenrechte, wie das Recht auf Leben und Entwicklung sowie das Recht auf physische und psychische Integrität, verweigert."

Zurzeit wird auf Grund einer Bundesratsinitiative eine Änderung des Strafgesetzbuches diskutiert, die zum Entschluss in den Bundestag eingebracht wird (Bundesrat, Drucksache 867/09). Dabei soll zum einen die Female Genital Cutting als eigener Straftatbestand aufgenommen werden, der eine Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren vorsieht. Zudem soll wegen der häufigen Minderjährigkeit der Betroffenen die Verjährungsfrist erst mit dem 18. Lebensjahr des Mädchens einsetzen. Die zugleich vorgesehene Erhöhung der vorgesehenen Freiheitsstrafen bedingt überdies eine Verlängerung der Verjährungsfrist auf 20 Jahre. Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Genitalbeschneidungen bei vorübergehenden Aufenthalten im Ausland wird durch eine Ergänzung der Auslandsstrafbarkeit ausgeweitet. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Genitalbeschneidungen, die außerhalb von Deutschland durchgeführt werden, von deutschen Behörden strafrechtlich verfolgt werden können, wenn es sich um ein in Deutschland lebendes Mädchen handelt. Es gibt Hinweise, dass Mädchen insbesondere während Ferienaufenthalten im Heimatland der Eltern beschnitten werden.

#### **4 Folgen der weiblichen Genitalbeschneidungen**

Als Folgen von FGC sind akute und chronische Komplikationen zu benennen:

##### **a) Akute Komplikationen**

- Psychisches Akut-Trauma
- Infektion
  - Lokalinfektion
  - Abszessbildung
  - Allgemeininfektion
  - Septischer Schock
  - HIV-/Hepatitis-Infektion
  - Tetanus
  - Gangrän
- Probleme beim Wasserlassen und bei der Menstruation
  - Urinretention
  - Ödem der Urethra
  - Dysurie
- Verletzung
  - Verletzung benachbarter Organe
  - Frakturen (Femur, Clavicula, Humerus)
- Blutung
  - Hämorrhagie
  - Schock
  - Anämie
  - Tod

##### **b) Chronische somatische Komplikationen**

- Sexualität/Menstruation
  - Dyspareunie/Apareunie
  - Vaginalstenose

- Infertilität/Sterilität
- Dysmenorrhoe, Sekretretention, protrahierte Blutungen
- Menorrhagie
- Chronische Vaginitis, Endometritis, Adnexitis
- Probleme beim Wasserlassen
  - Rezidivierende Harnwegsinfektion, chronische Pyelonephritis, Urämie
  - Prolongiertes Wasserlassen
  - Inkontinenz
  - Vaginalkristalle
- Komplikationen des Narbengewebes
  - Abszess- und Fistelbildung
  - Keloidbildung/Dermoidzysten/Neurinome
  - Hämatokolpos
- Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt
  - Vaginaluntersuchung erschwert
  - Katheterapplikation unmöglich
  - Messung des fetalen Skalp-pH unmöglich
  - Austreibungsphase verlängert
  - Perinealrisse
  - Postpartale Hämorrhagie
  - Perineale Wundinfektion
  - Vesico-/rektovaginale Fistelbildung
  - Perinatale Morbidität und Mortalität erhöht

### **c) Psychische und soziale Folgen**

Die Genitalbeschneidung hinterlässt häufig ein schwerwiegendes unauslöschbares körperliches und seelisches Trauma. Der gesamte Vorgang kann sich tief in das Unterbewusstsein des Mädchens eingraben und die Ursache für Verhaltensstörungen darstellen. Eine weitere schwerwiegende Folge ist der Vertrauensverlust des Mädchens in seine Bezugspersonen. Langfristig können diese Frauen unter dem Gefühl des Unvollständigseins, unter Angst, Depressionen, chronischer Reizbarkeit, Frigidität und Partnerschaftskonflikten leiden. Aufgrund der vielfach noch vorherrschenden Tabuisierung und dem daraus resultierenden Schweigegebot haben viele durch die Genitalbeschneidung traumatisierte Frauen keine Möglichkeiten, ihre Gefühle und Ängste auszudrücken und leiden im Stillen.

### **5 Betreuung der Frauen**

Patientinnen mit genitaler Beschneidung, insbesondere nach Infibulation, bedürfen der besonderen ärztlichen und psychosozialen Betreuung und Beratung, vor allem was die körperlichen Folgen (Genitalinfektion, Blaseninfektion, Fragen der Sterilität) sowie Sexualprobleme (Unmöglichkeit der Kohabitation, Dyspareunie) angeht.

Für Arzt-Patientin-Kontakte gelten folgende Empfehlungen:

- Einfühlsame Anamnese, eventuell mit Dolmetscherin (im Einzelgespräch und/oder mit der Familie). Es sollte den Frauen gegenüber der Terminus "Beschneidung" verwendet werden.
- Einfühlsame Befunderhebung und Untersuchung.
- Infektionen indiziert behandeln.
- Blut- und Urinabflussbehinderungen beheben.

- Je nach Beschneidungsgrad die Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr (Kohabitationsfähigkeit) herstellen durch Öffnung des Scheidenausgangs unter Anästhesie (s. Punkt 5). Dies setzt voraus, dass die Betreffende ausführlich psychologisch und praktisch auf die künftig veränderte Situation vorbereitet wurde.
- Bei schwangeren beschnittenen Frauen mit engem Scheidenausgang kann eine erweiternde Operation bereits während der Schwangerschaft medizinisch indiziert sein, insbesondere wenn Vaginal- und Blaseninfektion während der Schwangerschaft aufgetreten sind. Wegen einer möglichen Traumatisierung soll eine geeignete Anästhesieform gewählt werden, um Erinnerungen an die Beschneidung zu vermeiden.
- Die Öffnung der Infibulation kann auch unter der Geburt erfolgen. Durch die Eröffnung, einen kontrollierten Dammriss oder eine Episiotomie wird eine normale Geburt ermöglicht (s. Punkt 7).

## **6 Öffnung der Infibulation (Defibulation)**

Eine Öffnung der Infibulation kann insbesondere bei entsprechenden Beschwerden (rezidivierenden Harnwegsinfektionen, Menstruationsstörungen), bei Sterilität im Zusammenhang mit der Unmöglichkeit zum Geschlechtsverkehr und bei Sexualstörungen (insbesondere Dyspareunie) medizinisch indiziert sein. Im Einzelnen ist dies indiziert bei:

- Wunsch der Patientin
- Schwierigkeiten beim Wasserlassen
- erschwertem Geschlechtsverkehr
- Keloidbildung des Narbengewebes
- schwerer Dysmenorrhoe
- rezidivierenden Infektionen
- Einschlusszysten
- Geburt.

Hierzu ist vor dem Eingriff eine besondere Beratung notwendig, die medizinische Aspekte, aber auch den kulturellen Hintergrund anspricht. Der Eingriff muss unter Anästhesie durchgeführt werden, um eine Erinnerung an ein mögliches Trauma zu vermeiden.

## **7 Öffnen der Infibulation vor oder unter der Geburt und anschließende Wundversorgung**

In der Schwangerschaft soll durch den Geburtshelfer eingeschätzt werden, inwieweit die Beschneidung ein Geburtshindernis darstellen kann. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll eine eventuell unter der Geburt notwendige Öffnung der Beschneidung (Defibulation) erörtert werden, wobei die medizinischen, psychischen und sozialen Aspekte sowohl der Öffnung als auch der Wundversorgung nach der Geburt besprochen werden müssen. Ziel dieses Gespräches soll es sein, dass bei der Wundversorgung nach der Entbindung der Scheidenausgang so wieder hergestellt wird, dass es nicht zu möglichen Problemen wie unter Punkt 5 beschrieben kommen kann.

Um nicht zweimal einen operativen Eingriff durchzuführen, soll die Defibulation möglichst nur unter der Geburt durchgeführt werden.

Die Wundversorgung nach der Entbindung basiert auf den mit der Patientin während der Schwangerschaft besprochenen Festlegungen des Öffnens der Infibulation und der Wundversorgung nach der Geburt. Es darf kein erneuter Genitalverschluss in der Form vorgenommen werden, dass medizinische Probleme, wie rezidivierende Blaseninfektionen, Stau des Menstruationsblutes oder Schwierigkeiten beim Sexualverkehr, zu erwarten sind.

## **8 Rechtliche und ethische Beurteilung der Wundversorgung**

Rechtlich ist zwischen den verschiedenen Formen der (primären) Genitalbeschneidung und der Wundversorgung zu unterscheiden. Während das Erste eine schwere Körperverletzung darstellt, ist das Zweite eine medizinisch notwendige Maßnahme. Die Wundversorgung nach der Entbindung hat zum Ziel, die geöffneten Narben sowie den Dammriss oder den Dammschnitt zu versorgen.

Wie jede andere Heilbehandlung ist diese nur mit Einwilligung der Patientin nach erfolgter Aufklärung zulässig. Der Aufklärung und Information kommt bei der Behandlung der betroffenen Frauen besondere Bedeutung zu. Das Aufklärungsgespräch hat neben der verständlichen Darstellung der medizinischen Behandlung in angemessener Weise die besondere Situation der Frau zu berücksichtigen.

Verlangen Frauen mit Infibulation nach erfolgter Aufklärung die Wiederherstellung des körperlichen Zustandes wie vor der Geburt, muss der Arzt die Behandlung ablehnen, da die Reinfibulation (Wiederherstellung der Infibulation) per definitionem eine schwere Körperverletzung darstellt.

Der Arzt ist verpflichtet, die bestehenden Wunden so zu versorgen, dass keine gesundheitliche Beeinträchtigung der Frau entsteht. Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens der Frau.

## **9 Psychosoziale Beratung von Frauen mit weiblicher Genitalbeschneidung**

Frauen mit Female Genital Cutting stellen eine relativ kleine Gruppe der Wohnbevölkerung in Deutschland dar. Die vorhandenen Beratungsstellen im psychosozialen Bereich haben wenig Ausbildung sowie Erfahrung mit den besonderen Problemen dieser Frauen. Insbesondere in den Großstädten sollten daher vorhandene Beratungsstellen (z. B. Migrantinnenberatung) für dieses Konfliktfeld ausgebildet werden oder neue Beratungsstellen eingerichtet werden, die sich auch dieser besonderen Problematik widmen. Hierzu bedarf es eines Rahmens, der sowohl die staatlichen Beratungsstellen als auch die freigemeinnützigen Beratungsstellen einbezieht.

## **10 Prävention für die neugeborenen Töchter**

Entsprechend ihrem kulturellen Hintergrund haben die werdenden Mütter mitunter den Wunsch, eine Beschneidung auch bei ihren neugeborenen Töchtern zu veranlassen. Dies ist in jedem Fall zu vermeiden.

In der Beratung der Mütter sollen die medizinischen, psychischen und sozialen Folgen einer Beschneidung besprochen werden. Es bieten sich andere Riten der Aufnahme in die kulturelle Gemeinschaft an, so dass der Druck aufgrund des kulturellen Hintergrundes von diesen Frauen genommen werden kann. Die Entbindung in der Klinik kann die einzige Gelegenheit zur diesbezüglich rechtzeitigen oder präventiven Beratung sein. Sie ist deshalb im Interesse der neugeborenen Mädchen in jedem Fall zu nutzen. Eine wesentliche Rolle in der Prävention von Genitalbeschneidungen in Deutschland lebender Kinder haben auch die Pädiater, die (neugeborene) Mädchen betreuen, und die in angemessener Form auf die Nachhaltigkeit der Betreuung (und damit auch einer Kontrolle) durch die Vorsorgeuntersuchungen hinweisen.

## **11 Weitere politische Aktivitäten**

Die drei UN-Organisationen UNICEF (United Nations International Children`s Emergency Fund), WHO (World Health Organisation) und die UNFPA (United Nations Population Fund) treten für die Abschaffung der weiblichen Genitalbeschneidung ein. UNICEF fördert in zahlreichen Ländern wie zum Beispiel in Äthiopien, Mali, Sudan und Senegal Kampagnen gegen die Genitalbeschneidung. Dabei werden z.B. Entscheidungsträger und die Gesamtbevölkerung über lokale Radio- und Fernsehstationen für das Thema sensibilisiert, lokale Frauengruppen unterstützt und Programme zur Umschulung von Beschneiderinnen organisiert.

Die drei UN-Organisationen betonen, dass ein dauerhafter Erfolg in der Abschaffung der weiblichen Genitalbeschneidung nur dann zustande kommen kann, wenn Regierungen, politische und religiöse Institutionen, internationale Organisationen, Nicht-Regierungs-Organisationen und Hilfsorganisationen gemeinsam an der Aufklärung gegen diese Tradition mitwirken. Nur so kann auch ein gesetzliches Verbot in den betroffenen Ländern erreicht und umgesetzt werden.

Im Netzwerk „Integra“ haben sich 24 deutsche Organisationen zur Überwindung von weiblicher Genitalbeschneidung zusammengeschlossen<sup>2</sup>.

Ein wichtiges Beispiel für eine deutsche Nicht-Regierungs-Organisation, die sich seit Jahren mit vielen Projekten gegen die Female Genital Cutting einsetzt, ist die Organisation „Terre des Femmes“. Mittels einer intensiven und differenzierten Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit versucht diese Organisation zu erreichen, dass auch die Bevölkerung in Deutschland die genitale Beschneidung (FGC) als Menschenrechtsverletzung wahrnimmt und sich dagegen einsetzt.

International ist die deutsche Organisation „Target“ um Annette Weber und Rüdiger Nehberg sehr aktiv. Sie erreichten auf einer islamischen Konferenz der Al-Azhar Universität in Kairo im Jahr 2006 eine Ächtung der weiblichen Genitalbeschneidung mit Hilfe einer Fatwa. Außerdem arbeiten sie regional mit Aufklärungskampagnen, um insbesondere in ländlichen Gebieten die weibliche Genitalbeschneidung zu bekämpfen.

## **12 Hinweis**

Die aktuelle Empfehlung der DGGG „Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung“ basiert auf den Empfehlungen der Bundesärztekammer 2005 (<http://www.arzt.de/page>, Dtsch Arztebl 2006; 103(13) A 842-845).


### **Mitglieder der Arbeitsgruppe „Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung (Female Genital Cutting)“:**

Dr. Isabell Utz-Billing (Federführung)  
Prof. Dr. Heribert Kantenich  
Dr. Julia Henzgen  
Dr. Eva Kantelhardt  
Dr. Kerstin Rhiem

---

<sup>2</sup> <http://www.netzwerk-integra.de>. Das Netzwerk Integra hat gemeinsam mit der AG Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit Tropengynäkologie (AG FIDE e.V.) ebenfalls einen Leitfaden zur Weiblichen Genitalverstümmelung erstellt.





[www.frauenrechte.de](http://www.frauenrechte.de)



Arbeitskreis Frauengesundheit  
in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V.

[www.akf-info.de](http://www.akf-info.de)

## **Kommentar des Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF) und TERRE DES FEMMES (TDF) zu den Empfehlungen der DGGG zum Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung/Genitalverstümmelung**

Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e. V. (AKF) und TERRE DES FEMMES (TDF) begrüßen die vorliegenden Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach Weiblicher Genitalbeschneidung/Genitalverstümmelung (Female Genital Cutting/Mutilation, FGC/FGM) der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie sind ein weiterer wichtiger Schritt um FrauenärztInnen die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie im Umgang mit betroffenen Frauen und für die Prävention benötigen.

Eine 2005 vom Berufsverband der Frauenärzte, TERRE DES FEMMES und Unicef durchgeführte bundesweite Umfrage unter GynäkologInnen hat ergeben, dass 90% der befragten ÄrztInnen sich mehr Informationen zum Thema wünschten.<sup>1</sup> Daraufhin veröffentlichte die Bundesärztekammer 2006 Empfehlungen zum Umgang mit betroffenen Patientinnen.<sup>2</sup> 2007 erarbeitete die AG Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit (eine Sektion der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) unter Federführung von Dr. Christoph Zerm umfangreiche Empfehlungen.<sup>3</sup>

Wichtiger Bestandteil eines sensiblen Umgangs mit betroffenen Frauen ist die Wortwahl. Betroffene Frauen möchten nicht stigmatisiert und als verstümmelt wahrgenommen werden. Im direkten Umgang mit Betroffenen ist der Ausdruck „Beschneidung“ (aus diesem Grund auch in den Empfehlungen verwendet) angebracht. In der Öffentlichkeitsarbeit verwenden der AKF und TDF den Terminus weibliche Genitalverstümmelung (Englisch: Female Genital Mutilation, kurz FGM), um darauf aufmerksam zu machen, dass die Beschneidung eine Menschenrechtsverletzung darstellt.

Voraussetzung für eine einfühlsame Anamnese ist neben der Kenntnis gesundheitlicher Folgen der Beschneidung:

- die Erkenntnis, dass nicht jede betroffene Frau unter den möglichen Konsequenzen leiden muss.
- Kenntnis über die Verbreitungsgebiete (siehe Karte).
- das Wissen, dass Beschneidung nicht von nationaler, sondern von ethnischer Zugehörigkeit abhängt.
- Beschneidung weder in der Bibel noch im Koran als religiöses Gebot Erwähnung findet.

<sup>1</sup> BERUFSVERBAND DER FRAUENÄRZTE; TERRE DES FEMMES; UNICEF (Hrsg.): Schnitte in Körper und Seele. Eine Umfrage zur Situation beschnittener Mädchen und Frauen in Deutschland. Köln: 2005.

<sup>2</sup> Goesmann, Dr. Cornelia; Kentenich, Dr. Heribert: Empfehlungen zum Umgang mit Patientinnen nach weiblicher Genitalverstümmelung. In: Deutsches Ärzteblatt. Jg. 103. Heft 5. Köln: 2006.

<sup>3</sup> Zerm, Dr. Christoph (AG FIDE): Weibliche genitale Beschneidung – Umgang mit Betroffenen und Prävention. Empfehlungen für Angehörige des Gesundheitswesens und weitere potentiell involvierte Berufsgruppen. Herdecke: 2007.

- Wissen über die soziokulturelle Einbettung der Beschneidung (meist stellt sie in den Herkunftsländern eine Grundlage für die gesellschaftliche Akzeptanz von Frauen dar und gilt als Voraussetzung für eine Heirat).

Im Zentrum der Behandlung sollte die betroffene Frau und ihr Anliegen stehen. Bei Unsicherheit ist sensibles Nachfragen angebracht. Vermeiden Sie Werturteile! Eigene Gefühle wie Schock, Trauer oder Ekel sollten kontrolliert und nicht an die betroffene Frau weiter gegeben werden.

Bei einer Überweisung der Patientin sollte der Befund umfassend dokumentiert werden, um doppelte Untersuchungen und damit die Gefahr einer Retraumatisierung zu vermeiden.

Im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung sollte in jedem Fall die Chance für ein Präventionsgespräch genutzt werden. TERRE DES FEMMES hat dazu unter dem Titel „Wir schützen unsere Töchter“ eine kostenlose Präventionsbroschüre in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Kiswaheli und Somali herausgegeben. Diese ist erhältlich über [www.frauenrechte.de](http://www.frauenrechte.de)

Berlin, den 15. Februar 2012